

**Estimation de la taille à partir de la longueur de l'avant-bras**

Taille (m)	1,94	1,93	1,91	1,89	1,87	1,85	1,84	1,82	1,80	1,78	1,76	1,75	1,73	1,71
	Hommes (< 65 ans)	1,87	1,86	1,84	1,82	1,81	1,79	1,78	1,76	1,75	1,73	1,74	1,70	1,68
Hommes (> 65 ans)	1,84	1,83	1,81	1,80	1,79	1,77	1,76	1,75	1,73	1,72	1,70	1,69	1,68	1,66
Femmes (< 65 ans)	1,84	1,83	1,81	1,79	1,78	1,76	1,75	1,73	1,71	1,70	1,68	1,66	1,65	1,63
Femmes (> 65 ans)	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26	25,5
<b>Avant bras (cm)</b>	1,69	1,67	1,66	1,64	1,62	1,60	1,58	1,57	1,55	1,53	1,51	1,49	1,48	1,46
Hommes (< 65 ans)	1,65	1,63	1,62	1,60	1,59	1,57	1,56	1,54	1,52	1,51	1,49	1,48	1,46	1,45
Hommes (> 65 ans)	1,65	1,63	1,62	1,61	1,59	1,58	1,56	1,55	1,54	1,52	1,51	1,50	1,48	1,47
Femmes (< 65 ans)	1,61	1,60	1,58	1,56	1,55	1,53	1,52	1,50	1,48	1,47	1,45	1,44	1,42	1,40
Femmes (> 65 ans)	25,0	24,5	24	23,5	23,0	22,5	22,0	21,5	21,0	20,5	20,0	19,5	19	18,5
<b>Avant bras (cm)</b>														

Source : Société Britannique de Nutrition Entérale et Parentérale (BAPEN)

S'il n'est pas possible de peser ou mesurer la personne, on peut utiliser la taille anamnétique, ou la longueur de l'avant-bras, ou la hauteur du talon au genou ou l'envergure des bras (tables pages suivantes).

### 1. Taille

Si le patient ne connaît pas sa taille, utiliser :

#### La mesure de l'avant-bras

Distance entre l'olécrane et le styloïde (bras gauche, replié sur la poitrine)

